



Det fugtige vejr i Danmark gør det meget svært at få høet tørt nok!
Derfor opnåes den bedste kvalitet med

kunsttørret hø

"Min hest kan ikke tåle hø fordi den får hoste af hø".

"Efter jul plejer mit hø støve". Disse sætninger hører vi ofte og desværre vælger mange hesteholdere hø fra på grund af disse årsager. Hø er et godt grovfoder, hvis det er lavet af ordentlig græs, og hvis det er fremstillet på den rigtige måde.

Støv i hø stammer ofte fra skadelige svampesporer som dannes, hvis høet ikke er tørt nok ved presningen. Sol og varme er ikke tilstrækkelig til at lave hø, luftfugtigheden skal også passe. Ved kunsttørret hø er det muligt at styre processen og få høet tørt nok. Derudover er der andre parametre ved tørreprocessen der er afgørende for succes.

Vi laver analyser af alt vores hø på laboratorier i England og Tyskland.

På nedenstående kan der ses analyser på indholdet på skadelige svampesporer på almindelig hø købt på markedsvilkår og indholdet på skadelige svampesporer i vores kunsttørret hø.

Hø købt på markedsvilkår:

Microbiological results		
Methode: VDLUFA III 28.1.1 bis 28.1.4; 2017		
	Result in fresh matter	Assessment
Total count of yeast, moulds and dematiaceae		
Number of product-typical moulds and dematiaceae	3.3 LOG KbE/g 2000 cfu/g proven	normal
Cladosporium spp.		
Number of spoilage-indicating moulds	6.3 LOG KbE/g 1900000 cfu/g proven	drastically increased plate count
Aspergillus spp.		
Wallemia spp.		
Number of mucorales (spoilage-indicating moulds)	3.5 LOG KbE/g 3500 cfu/g	normal
Number of spoilage-indicating yeasts (all species)	6.2 LOG KbE/g 1550000 cfu/g	significant increased plate count
Evaluation of microbiological results		
The examined material shows an advanced spoiling process.		

Vores kunsttørret hø:

Microbiological results		
Methode: VDLUFA III 28.1.1 bis 28.1.4; 2017		
	Result in fresh matter	Assessment
Total count of yeast, moulds and dematiaceae		
Number of product-typical moulds and dematiaceae	3.8 LOG KbE/g 6500 cfu/g proven	normal
Moulds (unidentifiable)		Grænseværdi: 200.000 bE/g
Number of spoilage-indicating moulds	< 3,0 LOG KbE/g <1000 cfu/g	normal
Number of mucorales (spoilage-indicating moulds)	< 3,0 LOG KbE/g <1000 cfu/g	normal
Number of spoilage-indicating yeasts (all species)	4.0 LOG KbE/g 11000 cfu/g	normal
Evaluation of microbiological results		
In the examined material no microbiologically conditioned quality reductions are evident. As far as examined there are no objections to proper feeding.		

Vores hø bliver lavet på græsmarker, som er i omdrift hvilket betyder de er fri for skadelige planter. Græsset er udvalgt med henblik på lavt sukkerindhold.

Fordele ved kunsttørret hø

- Flot farve
- Kan anvendes til 'hoste heste' på grund af lavt støvindhold.
- Mange fine dele fra græsset da det ikke er faldet af på marken under mange vending.
- Ingen skadelig skimmelsvampe på grund af kontrolleret tørstofindhold.
- Mindre mængde støv fra jord på marken på grund af færre vendinger.
- Kan holde sig gennem hele vinteren på grund af en kontrolleret proces med korrekt tørring.
- Vitaminerne bibeholdes

Vi laver kunsttørret hø i rundballer med en diameter på 120 cm og en vægt på 250 kg.

Desuden laver vi kunsttørret hø i små baller med en vægt på ca. 15 kg.

Har du spørgsmål til vores hø eller wrap
så kontakt os endelig.

KILDSIG
HØ
CENTRAL

Kildsig Hø Central

Kildsigvej 23
DK-6971 Spjald

+45 4032 4025
Kildsig23@gmail.com
www.kildsig.com